

إجابات موثقة للأسئلة التي تدور برأسك حول لقاح كوفيد-19

25 مايو/أيار 2021

صدرت الموافقة على استخدام أربع لقاحات لكوفيد-19 في كندا، وتلقى ملايين الأشخاص هذه اللقاحات في جميع أنحاء العالم. تتناول هذه النشرة المخاوف والأسئلة الشائعة حول اللقاحات حتى تتمكن من الحصول على معلومات مفيدة حول ما يدخل إلى جسمك عند الحصول على لقاح كوفيد-19. تحقق جَمْعُ من الأطباء والباحثين من المعلومات الواردة في هذه النشرة.

هل يمكنني الحصول على اللقاح إذا كنت أعاني من الحساسية؟

نعم، من الآمن أن تتلقى لقاح كوفيد-19 حتى لو كنت قد أصبت في السابق بردود فعل تحسسية شديدة من مختلف الأطعمة أو الأدوية أو غيرها من المواد. في حال إصابتك بردود فعل تحسسية شديدة في السابق، فانتظر في مركز التطعيم لمدة 30 دقيقة بعد التطعيم للتأكد من أنك على ما يُرام. الطاقم الطبي موجود دائماً في الموقع لدعمك في حالة إصابتك برد فعل تحسسي في حالات نادرة. إذا عانيت من حساسية شديدة بسبب أحد مكونات لقاح كوفيد-19 المحددة (مثل بولي إيثيلين جلايكول [PEG] أو البولي سوربات) أو الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، يجب عليك التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية المتابع لك حول كيفية تلقي اللقاح بأمان. يرجى ملاحظة أن هذه الحساسيات المحددة نادرة جداً.



هل يمكنني تلقي اللقاح إذا كنت أعاني من حالة طبية؟

من الآمن تلقي اللقاح إذا كنت تعاني من حالات طبية مثل السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض القلب، أو الربو، أو فقر الدم. تم اختبار اللقاحات ووجد أنها آمنة وفعالة على أشخاص يعانون من حالات طبية مختلفة. إذا كنت تعاني من حالة صحية محددة أو كنت تتناول دواءً يَضعف جهازك المناعي (مرضاً مثبطاً للمناعة أو دواءً مثبطاً للمناعة، مثل العلاج الكيميائي أو جرعات عالية من حبوب الستيرويد، إلخ) أو أحد أمراض المناعة الذاتية، يجب عليك التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية المتابع لك لتحديد الوقت الأفضل لتلقي اللقاح.



هل يجب أن أنتظر حتى يتلقى معظم الناس اللقاح؟

لا. احصل على اللقاح بمجرد أن يحين دورك. سوف يحميك اللقاح من الإصابة بالمرض أو الموت بسبب كوفيد-19. حتى تاريخ 25 مايو/أيار، تلقى الناس حول العالم أكثر من مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19. ومن أجل إنهاء الوباء، يحتاج معظم الناس إلى تلقي اللقاح؛ كلما أسرع الجميع في الحصول على التطعيم، أصبحت مجتمعاتنا أكثر أماناً.





كم من الوقت يحميني اللقاح؟

لا يزال الباحثون يحاولون تحديد المدة التي توفر فيها اللقاحات الحماية بالضبط. قد يُطلب منك تلقي جرعات منشطة في المستقبل للحماية المستمرة ضد فيروس كوفيد-19.

تُعطى لقاحات كوفيد-19 في جرعة واحدة أو جرعتين، وفقاً لنوع اللقاح. إذا كان اللقاح الذي تتلقاه يُعطى في جرعتين، سيطلب منك الرجوع لتلقي الجرعة الثانية في وقت لاحق. يجب أن تتلقى الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح حتى تتمتع بمزيد من الحماية الكاملة من مرض كوفيد-19 الحاد أو الوفاة.

تذكر: يجب أن تستمر في اتباع جميع تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19، مثل ارتداء كمامة، والحفاظ على المسافة بينك وبين الآخرين، وغسل يديك، حتى بعد تطعيمك.

تحميك اللقاحات أنت والأشخاص الذين تحبهم من الإصابة بكوفيد-19. كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتلقون اللقاح، زادت حماية الجميع!



نأمل أن تستفيد من هذه النشرة! ندعوك إلى مشاركتها مع الآخرين على نطاق واسع، أو استخدامها كنصٍ لتسجيل صوتي أو فيديو، أو ترجمتها إلى لغات أكثر لمشاركتها مع الآخرين. يرجى التأكد من إضافة المصدر: مستشفى كلية النساء، OCASI، مركز تايبو للصحة المجتمعية ومنظمة 613 Refugee.

رُفِّقت في 25 مايو/أيار 2021

صانق على المعلومات الواردة في هذه النشرة هؤلاء الأطباء الكنديون: الطبيب الدكتور Meb Rashid، أستاذ مساعد في جامعة تورنتو؛ والطبيب الدكتور Vanessa Redditt، محاضر في جامعة تورونتو؛ والطبيب الدكتور Isaac I. Bogoch، أستاذ مشارك في جامعة تورونتو.

{ REFUGEE } 613

BE IN GOOD HEALTH
TAMBU
COMMUNITY
HEALTH CENTRE

OCASI
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants

WCHI
WOMEN'S COLLEGE HOSPITAL
Healthcare | REVOLUTIONIZED

Funded by:

Financé par :

With contributions from:



Immigration, Refugees
and Citizenship Canada

Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada

pchs
30
Serving Diverse Communities



Occupational Health
Clinics for Ontario
Workers Inc.

